

Tabel 5. Samenvatting individuele studies

Studie	Onderzoeksopzet	Vergelijking		
Muscarine-antagonisten				
Burgio et al. 2020 (Burgio, Kraus et al. 2020) USA	3-arm-parallel groep RCT Oudere mannen met LUTS (n=204)	Zelfmanagement + antimuscarinic (sustained-release Tolterodine, 4mg) + a-blocker (tamsulosin, 0.4mg)	Zelfmanagement of drug therapy	
Komesu et al. 2020 (Komesu, Schrader et al. 2020) USA	Non-inferiority RCT Vrouwen met UUI (n=152)	Muscarine-antagonist (ER Oxybutynin	ER tolterodine	Hypnotherapie
β3-adrenoceptoragonisten				
Yoshida et al. 2021 (Yoshida, Takeda et al. 2021) Japan	Posthoc-analyse van een RCT Patiënten met OAB (n=1108, overwegende vrouwen)	Vibegron	Placebo	
Zachariou et al. 2021 (Zachariou, Filiponi et al. 2021) Griekenland	Prospectief onderzoek (niet-random) Vrouwelijke patiënten met UUI (n = 91 mantelzorgers + n = 95 patiëntenparen)	Mirabegron	Mantelzorgers + patiënten die geen UI-behandeling kregen	
Muscarine-antagonisten vs. β3-adrenoceptoragonisten				
Huang et al. 2020 (Huang, Lin et al. 2020) Taiwan	Retrospectief single-center studie OAB-patiënten (n=215)	ER Oxybutynin, ER Tolterodine	Mirabegron	Behandeling stopgezet