

Tabel 2. Geneesmiddelen met een parasymphathicolytisch effect en hun effect op urine-incontinentie.

Medicatie met een parasymphathicolytisch effect	Effect op urine-incontinentie
Antihistaminica alimemazine, cinnarizine, clemastine, cyclizine, cyproheptadine, dexchlorfeniramine, dimetindene, hydroxyzine, ketotifen, mebhydroline, meclozine, oxememazine, promethazine, triplennamine	Kan zorgen voor relaxatie van de blaas. Bovendien kan het geheugen-gevolg hebben, waardoor de g
Antipsychotica chlorpromazine, chlorprothixene, clozapine, dosulepine, doxepine, levomepromazine, olanzapine, perfenazine, sulpiride, thioridazine, tiapride	Kan zorgen voor relaxatie van de blaas. Bovendien kan het geheugen-gevolg hebben. Tenslotte beperkt het toilet belemmeren.
Parasymphathicolytische parkinsonmiddelen biperideen, dexetimide, orfenadrine, trihexyfenidyl	Kan zorgen voor relaxatie van de blaas. Bovendien kan het geheugen-gevolg hebben, waardoor de g
Tricyclische antidepressiva amitriptyline, clomipramine, desipramine, imipramine, maprotiline, nortriptyline	Zorgen voor relaxatie van de blaas. Bovendien kan het geheugen-gevolg hebben, waardoor de g
Urologische parasymphathicolytica darifenacine, fesoterodine, flavoxaat, oxybutynine, solifenacine, tolterodine	In sommige gevallen worden de symptomen van de behandeling van urine-incontinentie verergerd. Urineretentie veroorzaakt en incontinentie kan worden veroorzaakt.
Overige middelen met parasymphathicolytische (bij)werking atropine, belladonna, cyclopentolate, deproprine, disopyramide, glycopyrronium, homatropine, ipratropium, papaverine, thiazinamium, tropicamide	Kan zorgen voor relaxatie van de blaas. Bovendien kan het geheugen-gevolg hebben, waardoor de g
Andere medicatie	Effect op incontinentie
Alfa-symphathicomimetica fenylefrine, midodrine, nafazoline, oxymetazoline, xylomethazoline	Kan urineretentie veroorzaken.
Alfa sympathicolytica alfuzosine, doxazosine, prazosine, tamsulosine, terazosine, urapidil	Verlagen tonus interne sfincter, kan stressincontinentie veroorzaken.
Angiotensine convertering enzyme (ACE)-remmers (A-II-remmers veroorzaken minder hoesten) benazepril, captopril, cilazapril, enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, trandolapril, zofenapril	Kan hoesten veroorzaken en stressincontinentie.
Betasymphaticomimetica (glaucoomduppels)	Deze kunnen urineretentie veroorzaken.
Calciumantagonisten (* itt parasymphathicolytica treden problemen in veel mindere mate op, maar het kan een oorzaak zijn van incontinentie) amlodipine, barnidipine, diltiazem, felodipine, isradipine, lacidipine, lercanidipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nitrendipine, verapamil	Kan verlaagde contractie van de blaas veroorzaken. Kan bovendien o
Diuretica	Kan polyuria (verhoogde urineproductie) veroorzaken. Kan bovendien o

o.a. furosemide, bumetanide	
<i>Opioïden (* itt parasympholytica treden problemen in veel mindere mate op, maar het kan een oorzaak zijn van incontinentie)</i> alfentanil, buprenorfine, codeïne, dextromoramide, dextropropoxyfeen, fentanyl, hydromorfon, methadone, morfine, nalbufine, nicomorfine, oxycodon, pentazocine, pethidine, piritramide, remifentanil, sufentanil, tramadol	Verlagen contractie blaasspier, kan het obstipatie, verwarring e Ook kan het sedatie (verminder toilet kan worden belemmerd.
<i>Sedativa en hypnotica</i> alprazolam, bromazepam, brotizolam, chloordiazepoxide, clobazam, clonazepam, clorapinezuur, diazepam, flunitrazepam, flurazepam, loprazolam, lorazepam, lormetazepam, midazolam, nitrazepam, oxazepam, prazepam, temazepam, zolpidem, zopiclon	Kan verwardheid en sufheid ve waardoor de gang naar het toilet