

Bijlage 10

Onderwerpen voor verder onderzoek – Kennislacunes

Uitgangsvraag 1 Preventie Delier

Thuisituatie: Overweeg om gericht vervolgonderzoek uit te voeren hoe het (Bundled) HELP programma het beste, praktisch uitgevoerd kan worden in de thuisituatie (rekening houdend met verschillende scenario's: alleenwonend/cognitieve problematiek, samenwonend met partner, alleenwonend met goed sociaal netwerk etc.), gebruikmakend van familieparticipatie of de inzet van vrijwilligers.

Verpleeghuis: Overweeg om gericht vervolgonderzoek uit te voeren hoe het (Bundled) HELP programma het beste, praktisch uitgevoerd kan worden in het verpleeghuis, gebruikmakend van familieparticipatie of de inzet van vrijwilligers.

Thuisituatie/ Verpleeghuis: Overweeg om gericht vervolgonderzoek uit te voeren met betrekking tot de vraagstelling hoe de vochtintake van ouderen met cognitieve problematiek (zelfstandig wonend en/of ouderen in het verpleeghuis) gestimuleerd kan worden en welke interventies hierbij effectief zijn.

Uitgangsvraag 2 Herkenning van delier

Er zijn geen onderzoeken gevonden die een indicatie kunnen geven over het herkennen van een delier in de thuisituatie, overweeg onderzoek hiernaar.

Uitgangsvraag 3 Onderscheid delier, dementie, depressie

Er zijn geen onderzoeken gevonden die een indicatie kunnen geven over delier en het onderscheid met dementie/depressie in de thuisituatie. In het algemeen kan worden gezegd dat de symptomen niet anders zijn, maar de mate waarin ze worden waargenomen en kunnen worden geregistreerd, kunnen verschillend zijn.

In de literatuur zijn geen aanwijzingen gevonden om het onderscheid tussen delier en depressie te maken.

Uitgangsvraag 6 Nazorg na delier

Er is geen literatuur gevonden hoe de zorg eruit kan zien om deze langetermijneffecten op te vangen in het verpleeghuis of thuis. In de literatuur is ook geen aandacht voor wie deze zorg zou moeten ontvangen: de cliënt zelf of ook de naaste/familie